

Maatilan Tebukonatsoli

Myyntipäällyksen teksti

Kasvitautilien torjuntaan**Varoitus**

Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Epäillään vaurioittavan sikiötä.

Misstänks kunna skada det ofödda barnet.

Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.

Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin.

Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp.

Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.

Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Valumat on kerättävä.

Samla upp spill.

Varastoi lukitussa tilassa.

Förvaras inlåst.

Sisältää propionihappoa ja hartsia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Innehåller propionsyra och harts. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Tehoaine: tebukonatsoli 200 g/l

Valmistetyyppi: EW

Käyttäjryhmä: ammattikäyttäjät

Käyttötarkoitus:

Kasvitautilien torjuntaan syys- ja kevätvehnällä, rukiilla, ruisvehnällä, syys- ja kevätohralla, kevät- ja syysrypsilla ja –rapsilla sekä siemenheinillä

Käytön rajoitukset:

Varoaika rypsilä ja rapsilla 56 vuorokautta, siemenheinällä 35 vuorokautta.

Käsiteltyjen siemenheinien olkia ei saa käyttää eläinten rehuksi.

Ympäristöhaittojen ehkäisy:

Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä.

Vesistöihin rajoituvilla alueilla traktoriruiskulla ruiskutettaessa on jätettävä vesieliöiden suojelemiseksi viljaviljelyksillä 3 metrin ja öljykasvi- sekä heinien siemenviljelyksillä 10 metrin suojaetäisyys vesistöihin. Koska pääosa vesistökuormituksesta johtuu pintavalunnasta, suojaetäisyyksiä ei voi kaventaa käyttämällä tuulikulkeumaa vähentäviä suuttimia.

Traktoriruiskun täyttöön vesistöistä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin.

Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jättepisteeseen.

Suojainohjeet:

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suoja-pukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitrili) ja päähinettä. Roiskevaaraa aiheuttavissa työvaiheissa on käytettävä lisäksi kasvojen- / silmiensuojainta ja hengitystiet altistavissa työvaiheissa hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella.

Resistenssin hallinta

Maatilan Tebukonatsoli:n tehoaine tebukonatsoli kuuluu vaikutustavaltaan FRAC-ryhmään 3, DMI-fungisidit. Riski resistenssin kehittymiselle tällä tehoaineella on keskinkertainen. Saman valmisteen tai valmisteen, jolla sama vaikutustapa, toistuva käyttö voi johtaa vastustuskykyisten tautikantojen kehittymiseen. Vastustuskyvyn kehittymisen estämiseksi suositellaan käytettäväksi valmistetta, jolla on toinen vaikutustapa, joko tankkiseoksena tai yksinään.

Käyttöohje:

Maatilan FTebukonatsolivoidaan käyttää kasvitautien torjuntaan viljassa, rapsissa, rypsisissä ja siemenheinässä, alla olevan taulukon mukaisesti.

Viljelykasvi	Kasvitauti	Käsittelyajankohta	Käyttömäärä
Vehnä	Härmä (<i>Blumeria graminis</i>)* Keltaruoste (<i>Puccinia striiformis</i>) Ruskearuoste (<i>Puccinia triticina</i>) Ruskolaikku (<i>Stagonospora nodorum</i>). Tyydyttävä teho: Lehtilaikku (<i>Septoria tritici</i>)* Tähkäfusaario (<i>Fusarium spp</i>)	BBCH 30- 69	1,25 l/ha Korkeintaan 1 annos per kasvukausi, jaettuna yhdelle tai kahdelle käsittelylle
Syysohra	Härmä (<i>Blumeria graminis</i>)* Ohranruoste (<i>Puccinia hordei</i>) Tyydyttävä teho: Ohran verkkolaikku (<i>Pyrenophora teres</i>) Rengaslaikku (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	BBCH 30- 69	1,25 l/ha Korkeintaan 1 annos per kasvukausi, jaettuna yhdelle tai kahdelle käsittelylle
Kevätohra	Härmä (<i>Blumeria graminis</i>)* Ohranruoste (<i>Puccinia hordei</i>)	BBCH 30- 69	1,25 l/ha Korkeintaan 1 annos per kasvukausi,

	Tyydyttävä teho: Ohran verkkolaikku (<i>Pyrenophora teres</i>) Rengaslaikku (<i>Rhynchosporium secalis</i>)		jaettuna yhdelle tai kahdelle käsittelylle
Ruisvehnä	Härmä (<i>Blumeria graminis</i>)* Keltaruoste (<i>Puccinia striiformis</i>) Ruskearuoste (<i>Puccinia recondita</i>) Ruskolaikku (<i>Stagonospora nodorum</i>). Tyydyttävä teho: Rengaslaikku (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	BBCH 30- 69	1,25 l/ha Korkeintaan 1 annos per kasvukausi, jaettuna yhdelle tai kahdelle käsittelylle
Ruis	Härmä (<i>Blumeria graminis</i>)* Ruskearuoste (<i>Puccinia recondita</i>) Tyydyttävä teho: Rengaslaikku (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	BBCH 30- 69	1,25 l/ha Korkeintaan 1 annos per kasvukausi, jaettuna yhdelle tai kahdelle käsittelylle
Kaura	Härmä (<i>Blumeria graminis</i>)* Rengasruoste (<i>Puccinia coronata</i>)	BBCH 30- 69	1,25 l/ha Korkeintaan 1 annos per kasvukausi, jaettuna yhdelle tai kahdelle käsittelylle
Siemenheinä	Heinän ruoste (<i>Puccinia spp</i>) Tyydyttävä teho: Härmä (<i>Blumeria graminis</i>)* <i>Mastigosporium</i> ja Rengaslaikku (<i>Rhynchosporium orthosporum</i>) koiranheinässä Lehtilaikku (<i>Helminthosporium spp</i>) raiheinässä	BBCH 31- 55	1,25 l/ha Korkeintaan 1 annos per kasvukausi, jaettuna yhdelle tai kahdelle käsittelylle
Rapsi ja rypsi (talvi- tai kevät-rapsi/rypsi)	Kuivamätä (<i>Leptosphaeria maculans, Phoma lingam</i>) Pahkahome (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>) Tyydyttävä teho: Harmaahome (<i>Botrytis cinerea</i>) Taimipolte (<i>Alternaria brassicae</i>)	Syksy BBCH 14-20 kukinta, BBCH 60-69	0,875 l/h 1,25 l/h Käsittely vain syksyllä (phoma) tai keväällä

* Härmä, täysi teho saadaan ennaltaehkäisevällä torjunnalla. Tartunnan jo tapahduttua käsittelyn teho on vain tyydyttävä.

Maatilan FTebukonatsolitehoa erityisesti sellaisia kasvitauteja vastaan kuin: härmä, keltaruoste, ohranruoste ja pahkahome. Tuotteella on tyydyttävä teho tähkäfusaariota, lehtilaikkua, rengaslaikkua, ohran verkkolaikkua, harmaahometta ja taimipoltetta vastaan.

Rapsin ja rypsin käsittely syksyllä: Syysrapsin kuivamätä (*Phoma*) käsitellään syksyllä kehitysasteella BBCH 14-20. Huomioi, että käsittely syksyllä kuivamätää vastaan voi alentaa öljykasvien kasvukorkeutta. Tämä ei vaikuta negatiivisesti talvehtimiseen tai satoon.

Huomautukset:

Maatilan FTebukonatsolivoidaan sekoittaa useiden muiden kasvinsuojeluaineiden kanssa. Orus 200 EW torjuu kasvitauteja heti kasvuston kasvunlähdon jälkeen, kun lämpötila on noussut yli 6 °C
Voimakkaassa auringonpaisteessa ja yli 25 °C lämpötiloissa torjunta on tehtävä klo 20.00 jälkeen tai ennen klo 06.00.
Sade ei heikennä valmisteen tehoa tunnin jälkeen käsittelystä.

Luvanhaltija: xxx

Valmistaja ja pakkaaja: xxx

Edustaja Suomessa: xxx

Rekisterinumero: 3342

Nettotilavuus: 000

Valmistuserän numero ja valmistuspäivä: XXXXX

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi kasvinsuojeluaineena 29.12.2015.