

Myyntipääillyksen teksti

Maatilan Trineksapakki M

Kasvunsääde

Tehoaineet

Trineksapakki-etyyli 250 g/l, 25 % (w/v)

Valmistetyyppi: EC

Käyttäjärhmä: Ammattikäyttäjät

Käyttötarkoitus: Kasvunsäätöön ja lakoutumisen estämiseen ruis-, ruisvehnä-, syysvehnä-, kevätvehnä-, ohra- ja kauraviljelysiltä sekä timotein ja nurminadan siemenviljelysiltä.



Varoitus/Varning

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Haitallista hengitettynä. Skadligt vid inandning.

Saattaa vahingoittaa elimiä (ruoansulatuskanava) pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa . Kan orsaka organskador (mag-tarmkanal) genom lång eller upprepad exponering .

Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi. För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn.

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU I HOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.

Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

Valumat on kerättävä. Samla upp spill.

Suojainohjeet

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä suojapukua, kumisaappaita, kemikaalinkestäviä suojakäsineitä (esim.

nitriili), päähinettä sekä kasvojensuojainta. Hengitysteitä altistavissa työtilanteissa on käytettävä lisäksi yhdistetyllä suodattimella (P2/A2) varustettua hengityksensuojainta.

Käytön rajoitukset

Vesistörajoitus

Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä.

Vesistöihin rajoittuvilla alueilla ruiskutettaessa on jätettävä vesieliöiden suojelemiseksi 3 metrin suojaetäisyys vesistöihin. Traktoriruiskun täyttöön vesistöä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin.

Muut rajoitukset

Käytettävä ennen tähkän/röyhyn esille tuloa.

Suositukses ja ohjees

Varastointi ja säilyvyys

Säilytettävä +0 - +35* C:n lämpötilassa.

Pakkausten ja valmistees hävittäminen

Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jättepisteeseen.

Käyttöohje:

Käsittelyaika:

Ruis ja ruisvehnä ruiskutetaan lippulehtivaiheessa, kun lippulehti on tullut kokonaan esiin, kuitenkin ennen tähkän esille tuloa kehitysasteella Z 39-45 (vrt. Zadoksin asteikko).

Syysvehnä ruiskutetaan korrenkasvun aikana, eli 1-solmuvaiheesta lippulehdelle, kehitysasteet Z 31-39. Kasvunsäätökäsittely voidaan myös jakaa kahteen annokseen. Käyttömäärä valitaan syysvehnän kehitysasteen mukaan niin, että aikaisemmassa vaiheessa käytetään pienempää annosta.

Kevätviljat ruiskutetaan pääsääntöisesti korrenkasvun lopulla, koska paras laonestovaikutus saadaan yleensä ruiskutettaessa lippulehtivaiheessa. Jos laonuhka on ilmeinen jo ennen lippulehtivaihetta, voidaan käsittely tehdä pensomisen lopulta Z 30 lähtien joko kertaruiskutuksena tai jaettuna käsittelynä. Jaetussa käsittelyssä ensimmäinen ruiskutus tehdään pensomisen lopussa-korrenkasvun alussa Z 30-31 ja toinen ruiskutus tarvittaessa lippulehtivaiheessa Z 37-39. Kaurakasvusto on kuitenkin ruiskutettava viimeistään lippulehden alkaessa tulla esiin kehitysasteella Z 37.

Timotein siemenviljelykset käsitellään 1-2 -solmuvaiheen Z 31 ja lippulehtivaiheen Z 38 välillä.

Nurminadan siemenviljelykset käsitellään 1-2 -solmuvaiheen Z 31 ja lippulehtivaiheen Z 38 välillä.

Kasvilaji	Käyttömäärä l/ha kertaruiskutus	Käyttömäärä l/ha kerta-annos jaetussa käsittelyssä	Kehitysaste Zadoks
Ruisvehnä	0,5-0,7		39-45
Ruis	0,5-0,7		39-45
Syysvehnä	0,2-0,3 0,3-0,4	0,2 0,2-0,3	31-33 34-39
Ohra, 2-tahoinen	0,15-0,4	0,15-0,3	30-39
lyhyet lajikkeet (Saana)	0,1-0,3	0,1-0,2	30-39
Ohra, monitahoinen	0,2-0,5	0,2-0,3	30-39
Kevätvehnä	0,2-0,3	0,15-0,2	30-39
Kaura	0,15-0,3	0,1-0,15	30-37
Timotei	0,6-0,8	0,4	31-38
Nurminata	0,6-0,8	0,4	31-38

Maatilan Trineksapakki M –valmisteen kokonaismäärä kaksi kertaa ruiskutettaessa saa olla enintään kertaruiskutuksen maksimiannos tai lakoriskin ollessa erityisen suuri 0,1 l/ha sitä enemmän. Suurimpia määriä käytetään vain heikkokortisilla lajikkeilla kasvuille suotuisissa oloissa lakoriskin ollessa erityisen suuri. Lyhytkortisille lajikkeille suositellaan käytettäväksi alimpia käyttömääriä. Kevätviljan aikaisessa kehitysvaiheessa tehtyä käsittelyä voi lakoriskin ollessa suuri vielä täydentää lippulehtivaiheen käsittelyllä. Ruiskutettaessa valmistetta yhdessä kasvitautilien torjuntaan tarkoitettujen kasvinsuojeluaineiden kanssa vähennetään Maatilan Trineksapakki M -valmisteen määrästä 0,1 l/ha. Alin käyttömäärä tankkiseoksissa on kuitenkin 0,1 l/ha. Erityisen rehevässä syysviljassa klormekvattikloridiruiskutus viljan 1-solmuvaiheessa voi olla tarpeen riittävän lujan korren

saavuttamiseksi. CCC-ruiskutuksen jälkeen tapahtuvassa Maatilan Trineksapakki M -käsittelyssä ei tule käyttää kaikkein suurimpia annoksia.

Vettä käytetään 200 - 300 l/ha.

Huomautukset:

Valmiste imeytyy kasveihin lehtien ja korren kautta.

Käsiteltävän kasvuston tulee olla terve ja voimakkaassa kasvussa. Poudanaroilla mailla kasvavaa ja/tai kuivuudesta, märkyydestä, ravinteiden puutteesta, taudeista tai muusta stressitekijästä kärsivää kasvustoa ei saa ruiskuttaa. Jo lakoontuneeseen kasvustoon valmiste ei enää vaikuta.

Parhaat ruiskutusolot ovat aamulla tai aamupäivällä lämpötilan ollessa +10-24°C ja ilman suhteellisen kosteuden ollessa yli 50 %. Sade 4 tunnin kuluessa ruiskutuksesta huonontaa tehoa, mutta vähäinen aamukaste ei. Käsittelyä ei saa tehdä helteellä eikä kuivissa oloissa.

Soveltuu erityisesti heikkokortisille lajikkeille silloin, kun maan hyvä kasvukunto ja kasvukauden sääolot lisäävät viljan lakoriskiä. Vaikutus eri viljalajikkeisiin voi vaihdella. Suuremmat Maatilan Trineksapakki M -annokset voivat viivästyttää ohran tähkälletuloa, etenkin korrenkasvun lopulla käytettäessä.

Käsittely ei rajoita olkien tai heinän käyttöä karjan ruokinnassa, kompostissa jne.

Säilytettävä +0 - +35° C:n lämpötilassa.

Ruiskutusnesteen valmistaminen:

Ruiskun säiliö täytetään ensin puolilleen tai 3/4:aan puhtaalla vedellä, johon valmiste sekoitetaan. Sen jälkeen lisätään loppu tarvittavasta vesimäärästä. Sekoittajan annetaan olla käynnissä ruiskutusnesteen valmistuksen ja levityksen aikana.

Käytön jälkeen tankki pestään huolellisesti vedellä.

Sekoitettavuus:

Kevätviljoilla Maatilan Trineksapakki M –valmisteen voi ruiskuttaa tankkiseoksena rikkakasvien torjuntaan käytettävien pienannosaineiden sekä MCPA:n kanssa. Ruiskutettaessa tankkiseoksena muiden fenoksihappovalmisteiden kanssa vioitusriski kasvaa altistavissa olosuhteissa. Soveltuu yhdistettäväksi kasvitautilien ja tuhohyönteisten torjuntaan tarkoitettujen kasvinsuojeluaineiden sekä kelaattimuodossa olevien lehtilannoitteiden kanssa. Sekoitusmahdollisuus koskee yhtä tuotetta kerrallaan, ja se on tarkistettava k.o. valmisteen myyntipäällyksestä tai markkinoijan ohjeista. Seokset on ruiskutettava heti yhdistämisen jälkeen.

Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi kasvinsuojeluaineena

Luvanhaltija:

Luvanhaltija täyttää lopulliseen etikettiin

Rekisterinumero: 3309

Valmistuserän numero ja valmistuspäivä:

Luvanhaltija täyttää lopulliseen etikettiin

Pakkauskoko:

Luvanhaltija täyttää lopulliseen etikettiin